紫芝液体深层发酵条件的初步研究

付丽红¹, 王金菊¹, 郝利民², 王艳萍¹

(1. 食品营养与安全教育部重点实验室, 天津科技大学食品工程与生物技术学院, 天津 300457;
2. 中国人民解放军总后勤部军需装备研究所, 北京 100010)

摘要: 以紫芝为研究对象, 讨论液体深层发酵碳源、氮源、无机盐和培养条件对菌体生物量的影响, 确定紫芝液体发酵最优培养基配方为葡萄糖 30 g/L、蛋白胨 3 g/L、 KH_2PO_4 1.2 g/L 和 $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 0.8 g/L。发酵条件为培养温度 25 °C, 起始 pH 自然, 装液量 24%, 接种量 15%, 140 r/min 培养 7 d。同时, 以菌体生物量、胞外多糖和 pH 为指标, 绘制紫芝液态发酵动力学曲线, 发酵培养 7 d 后菌体生物量和胞外粗多糖的含量分别达到最大值 3.63 g/L 和 1.67 g/L。

关键词: 紫芝; 深层发酵; 菌体生物量; 胞外多糖

中图分类号: Q815 文献标志码: A 文章编号: 1672-6510(2013)05-0019-04

Preliminary Study of Liquid Submerged Fermentation of *Ganoderma sinensis*

FU Lihong¹, WANG Jinju¹, HAO Limin², WANG Yanping¹

(1. Key Laboratory of Food Nutrition and Safety, Ministry of Education, College of Food Engineering and Biotechnology, Tianjin University of Science & Technology, Tianjin 300457, China;
2. The Quartermaster Institute of the General Logistics Department of P.L.A, Beijing 100010, China)

Abstract: The effect of nutritional and environmental conditions on mycelial biomass of *Ganoderma sinensis* in liquid fermentation were studied with a single factor and an orthogonal experiment. The results show that the best carbon source and nitrogen source are glucose and peptone respectively. Consequently, the optimal culture medium components were: 30 g/L glucose, 3 g/L peptone, 1.2 g/L KH_2PO_4 and 0.8 g/L $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$. The optimum culture conditions were as follows: the liquid medium volume was 24%, inoculation quantity 15%, culture temperature 25 °C, shaking frequency 140 r/min, and pH value was natural. The liquid fermentation kinetics curve was determined by biomass, crude extrapolymer and pH, and the optimization fermentation time was 7 d. Then the mycelium yield and extrapolymer could reach 3.63 g/L and 1.67 g/L, respectively.

Key words: *Ganoderma sinensis*; submerged fermentation; mycelial biomass; extrapolymer

紫芝 (*Ganoderma sinensis*) 别名黑芝、玄芝, 隶属于真菌界 (Fungi), 担子菌门 (Basidiomycota), 伞菌纲 (Agaricomycetes), 多孔菌目 (Polyporales), 灵芝科 (Ganodermataceae), 灵芝属 (*Ganoderma*), 是一种珍稀的食药真菌^[1]。据《本草纲目》记载, 紫芝味甘、温, 无毒, 有利关节、保神、益精气、坚筋骨、好颜色、疗虚劳、久服轻身、不老延年等滋补强壮的功效^[2]。紫芝营养价值丰富, 富含蛋白质、氨基酸、多糖、三萜类等生物活性物质。研究表明, 紫芝具有抗

氧化^[3]、抗肿瘤^[4]、抑菌^[5]和提高免疫力^[6]等诸多功效。

紫芝在食药方面具有重要价值, 得到广大消费者的青睐, 在国内外具有广阔的市场前景。但人工栽培的紫芝生产周期长, 产率低, 而且受季节、气候等外界因素影响较大, 因此其产量远远不能满足市场需求。液体深层发酵技术可以在短时间内获得大量菌丝体和发酵产物, 成本低, 易于规模化生产^[7], 最为重要的是发酵获得的发酵液具有与紫芝子实体类似的

收稿日期: 2013-03-24; 修回日期: 2013-05-29

基金项目: 全军科研重点项目“军用功能基础原料生物制备技术研究”(AX110C002)

作者简介: 付丽红 (1984—), 女, 山西人, 博士研究生; 通信作者: 王艳萍, 教授, ypwang@tust.edu.cn.

功效,由此在综合开发方面具有极大的潜力.本研究以菌体生物量和胞外多糖为指标,通过对紫芝液体发酵培养基的初步研究,并探讨其适宜的发酵条件,为后续的工业化生产提供物质基础及理论依据.

1 材料与方法

1.1 实验材料

1.1.1 菌种

紫芝,天津科技大学食品生物技术研究室保藏菌种.

1.1.2 培养基

PDA 培养基(g/L):马铃薯 200,葡萄糖 20, KH_2PO_4 2, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 1,琼脂 20, pH 自然.

种子培养基(g/L):马铃薯 200,葡萄糖 30,蛋白胨 3, KH_2PO_4 1, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 1, pH 自然.

基础培养基(g/L):葡萄糖 30,蛋白胨 3, KH_2PO_4 1, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 1, pH 自然.

1.2 实验方法

1.2.1 菌种活化

将保存的紫芝菌种接入 PDA 斜面培养基,25 °C 下培养,待菌体长满斜面后,将斜面上的母菌接入到 PDA 固体平板培养基上,25 °C 恒温培养.

1.2.2 摇瓶菌种制备

用打孔器从 PDA 固体平板上打取直径为 5 mm 的菌丝体 10 块接入到新鲜的种子培养基中(500 mL 挡板三角瓶,装液量 100 mL),25 °C、140 r/min 振荡培养 7 d,得到摇瓶种子液.

1.2.3 摇瓶发酵培养

(1) 碳源、氮源单因素实验

碳源筛选实验:在基础培养基中(蛋白胨 3 g/L, KH_2PO_4 1 g/L, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 1 g/L)分别加入 30 g/L 的葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖、可溶性淀粉作为碳源,每个实验重复 3 次.

氮源筛选实验:在基础培养基中(葡萄糖 30 g/L, KH_2PO_4 1 g/L, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 1 g/L)中分别加入 3 g/L 的蛋白胨、酵母粉、 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 、 NH_4Cl 和 NH_4NO_3 作为氮源,每个实验设 3 个重复.

(2) 碳源、氮源及无机盐正交实验

根据碳源和氮源单因素实验结果,选用 K_2HPO_4 和 $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 作为无机盐,设计 $\text{L}_9(3^4)$ 正交实验.

(3) 发酵条件的选择

在确定最佳发酵培养基成分的基础上,设计不同温度、pH、装液量和接种量,进行单因素实验,测定

菌丝体生物量,确定最佳发酵条件,每个实验设 3 个重复.

1.2.4 发酵动力学曲线

按照以上确定的发酵培养基和发酵条件进行摇瓶培养,在发酵过程中检测菌丝体生物量、胞外多糖和 pH.

1.3 测定方法

1.3.1 生物量的测定

发酵结束后,将发酵液真空抽滤得菌体,用蒸馏水冲洗数次,然后 55 °C 烘干至恒质量,称量,计算菌丝体干质量^[8].

1.3.2 粗多糖的测定

将抽滤除菌丝体的发酵液经真空浓缩至原体积的 1/4,加入 4 倍体积的无水乙醇,4 °C 醇沉 12 h,8000 r/min 离心 10 min,弃上清液,将沉淀物 55 °C 烘干至恒质量,称量粗多糖含量^[9].

1.3.3 pH 的测定

用 DELTA 320 型酸度计进行 pH 的测定.

2 结果

2.1 培养基的确定

2.1.1 碳源的选择

经发酵培养,筛选出最适碳源,从图 1 可以看出,以葡萄糖为碳源的菌丝体生物量(2.11 g/L)最高,其余依次为可溶性淀粉、蔗糖、乳糖、麦芽糖.葡萄糖作为一种速效碳源,可以被菌体直接利用,快速促进菌体生长,且价格相对低廉,因此采用葡萄糖为最适碳源.

图 1 不同碳源对紫芝生物量的影响

Fig. 1 Effect of carbon sources on biomass of *Ganoderma sinensis*

2.1.2 氮源的选择

氮源是合成菌丝中蛋白质和核酸的必要成分,在发酵培养中起重要作用.从图 2 可见,蛋白胨和酵母浸粉有利于菌丝生长,菌丝生物量分别达到 2.35 g/L

和 2.03 g/L. 当氮源为无机氮时,如 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 、 NH_4Cl 和 NH_4NO_3 , 其生物量较低,说明紫芝对无机氮的利用不佳. 因此,选择蛋白胨为最适氮源.

图2 不同氮源对紫芝菌体生物量的影响

Fig. 2 Effect of nitrogen sources on biomass of *Ganoderma sinensis*

2.1.3 培养基正交实验结果

通过碳源和氮源的单因素实验结果,选用葡萄糖(A)为碳源,蛋白胨(B)为氮源, KH_2PO_4 (C)和 $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (D)为发酵真菌常用无机盐,进行 $L_9(3^4)$ 实验,结果见表2.

表2 培养基组分正交实验结果的极差分析

Tab. 2 Results of orthogonal experiment on different components

实验号	A/ (g·L ⁻¹)	B/ (g·L ⁻¹)	C/ (g·L ⁻¹)	D/ (g·L ⁻¹)	生物量/ (g·L ⁻¹)	粗多糖量/ (g·L ⁻¹)
1	25	2.5	0.8	0.8	2.69	0.65
2	25	3.0	1.0	1.0	2.61	1.08
3	25	3.5	1.2	1.2	2.37	0.98
4	30	2.5	1.0	1.2	2.99	1.20
5	30	3.0	1.2	0.8	3.23	1.45
6	30	3.5	0.8	1.0	2.46	1.23
7	35	2.5	1.2	1.0	3.05	1.34
8	35	3.0	0.8	1.2	2.73	1.25
9	35	3.5	1.0	0.8	2.92	1.35
K_1	7.67	8.71	7.88	8.84		
K_2	8.65	8.57	8.50	8.12		
K_3	8.70	7.74	8.64	8.07		
K_1'	2.70	3.23	3.13	3.45		
K_2'	3.88	3.78	3.63	3.68		
K_3'	3.98	3.55	3.80	3.43		
R_1	1.03	0.97	0.75	0.77		
R_2	1.28	0.55	0.68	0.25		

极差 R_1 分析结果表明,4种因素对紫芝菌丝生物量的影响程度为 $A > B > D > C$,极差值 R_2 分析得到,其对粗多糖影响为 $A > C > B > D$,极差值越大,作用效果也越大,这说明葡萄糖浓度对紫芝生物量和多糖的影响最大. 以生物量和胞外多糖为衡量指标,选择最适培养基组合为:葡萄糖 30 g/L、蛋白胨

3 g/L、 KH_2PO_4 1.2 g/L 和 $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 0.8 g/L.

2.2 发酵条件的选择

2.2.1 初始 pH 确定

用 1 mol/L NaOH 和 1 mol/L HCl 调节培养基的 pH 分别为 4、5、6、7、8 和 9,进行紫芝液体深层发酵培养,结果如图 3 所示. 在 pH 5~7 时,菌丝体能很好地生长,当 pH 为 6 时,菌体生物量最高(3.57 g/L),而测得发酵培养基的自然 pH 接近 6,因此采用培养基的自然 pH 即可.

图3 初始 pH 对紫芝深层发酵的影响

Fig. 3 Effect of initial pH on liquid fermentation of *Ganoderma sinensis*

2.2.2 温度确定

在适合的温度范围内,菌丝体生长代谢旺盛,可快速进入稳定期. 若低于适合温度范围,菌体将生长缓慢;高于该范围时,菌体代谢异常,若持续升温,菌体生长会受到抑制,严重导致其死亡^[10]. 在 20、25、30 °C 条件下分别发酵培养,其生物量结果如图 4 所示. 从图中可看出,25 °C 时菌体生物量达到最大值. 因此,确定最佳培养温度为 25 °C.

图4 不同温度对菌丝体生物量的影响

Fig. 4 Effect of different temperature on biomass of *Ganoderma sinensis*

2.2.3 接种量确定

在发酵生产中,选择合适的接种量可以使菌种快速进入对数期,从而缩短发酵周期. 在其他条件不变的情况下,分别接入 5%、10%、15%和 20%的种子液,

25 °C 振荡培养 7 d, 以菌丝体生物量为指标, 确定最佳接种量, 结果如图 5 所示, 接种量 15% 时获得的菌体含量最大.

图 5 不同接种量对菌丝体生物量的影响

Fig. 5 Effect of different inoculated volumes on biomass of *Ganoderma sinense*

2.2.4 装液量确定

溶氧是需氧发酵控制最重要的参数之一, 本实验采用摇瓶装液量以反映不同通气量对菌丝生物量的影响. 从图 6 可看出, 100 mL 和 120 mL 装液量所得的菌丝生物量均较高, 装液量高于 140 mL 时菌丝生物量有所下降, 原因是装液量多, 则通气量下降, 培养基中溶解氧少, 无法满足菌体旺盛生长的需要, 导致生物量下降. 因此, 取 24% (120 mL/500 mL) 为最佳摇瓶装液量.

图 6 不同装液量对菌丝生物量的影响

Fig. 6 Effect of different medium volume on biomass of mycelia

2.3 发酵动力学曲线

采用上述优化的培养基和工艺条件, 考察紫芝发酵培养过程中菌体生物量、粗多糖和 pH 的变化, 结果如图 7 所示. 菌丝体是生物发酵过程中的重要指标, 在发酵过程中, 1~7 d 菌丝体前期增加缓慢, 随后加速增加, 到第 7 天时达到最大值, 随后进入相对稳定的阶段; pH 随着菌体基质分解代谢产生有机酸而逐渐下降; 发酵液中粗多糖随着发酵时间增加而增加, 到第 7 天达到最高值 1.67 g/L, 随后为了维持菌

体生长, 开始消耗发酵液中的多糖, 其多糖含量降低, 所以确定最佳发酵周期为 7 d.

图 7 紫芝发酵过程中生物量、粗多糖和 pH 的变化

Fig. 7 Changes of biomass, crude extrapolymer and pH in the fermentative liquid of *Ganoderma sinense*

3 讨论分析

本文以菌体生物量为指标, 通过单因素筛选和正交实验, 确定了紫芝深层发酵培养基为: 葡萄糖 30 g/L、蛋白胨 3 g/L、KH₂PO₄ 1.2 g/L 和 MgSO₄·7H₂O 0.8 g/L. 最佳培养条件为: 装液量 24%, 接种量 15%, 起始 pH 自然, 25 °C、140 r/min 培养 7 d. 在此条件下, 菌体生物量和胞外多糖分别达到最大值 3.63 g/L 和 1.67 g/L. 有学者也对紫芝深层发酵进行优化, 如王晓玲等^[11-12]采用响应面、单因素及正交实验, 筛选了紫芝发酵的两种培养基配方分别为: (1) 玉米粉 20.3 g/L, 蛋白胨 3.6 g/L, 黄豆粉 6.9 g/L, 蔗糖 19.5 g/L, 菌体产量 12.82 g/L; (2) 蔗糖 35 g/L、蛋白胨 3 g/L、酵母膏 1 g/L、磷酸二氢钾 0.7 g/L、硫酸镁 0.2 g/L、VB1 0.01 g/L, 菌体产量 9.3 g/L. 这两种培养基与本研究结果相比, 配方组分复杂, 使得发酵操作繁琐, 而且价格成本高. 虽然两种培养基获得的菌体生物量高于本研究, 但本实验获得的胞外多糖达到 1.67 g/L. 胞外多糖是发酵液的主要功能成分, 这对日后研究多糖功效和结构提供了物质基础. 王晓玲^[13]通过在培养基中添加 5% 九香虫, 其多糖含量仅达到 0.280 g/L, 可能是实验菌种差异和发酵条件不同造成的. 先前的研究是单独研究培养基或发酵条件^[14], 本实验综合起来, 系统地研究紫芝液态发酵培养参数, 这将为大规模工业化生产提供技术支持和理论依据. 同时, 通过发酵获得的菌丝体和活性物质, 如多糖、多酚和蛋白质等, 为日后功能性活性物质的开发和研究奠定基础.

(下转第 27 页)